

var Prévalence diabète ([Atlas](#))

Description

Pourcentage de bénéficiaires de l'assurance maladie en Belgique qui, au cours de l'année de référence, ont suivi un traitement à [l'insuline](#) ou aux [médicaments hypoglycémisants](#) (code ATC A10) et/ou fait l'objet d'un suivi via des systèmes de soins diabète ([trajet de démarrage](#), [trajet de soins](#) ou [convention diabète](#)). L'indicateur peut être ventilé selon le sexe, la tranche d'âge et le droit à l'intervention majorée des bénéficiaires.

Codification

Nombre par 1 000 bénéficiaires

Remarques

- Il existe plusieurs types de diabète, qui supposent tous un taux de glycémie perturbé.
- **Diabète mellitus type 2** : le type le plus fréquemment observé (dans environ 90 % des cas) chez les patients qui présentent une sensibilité réduite aux effets de l'insuline. Cette forme survient généralement à un âge avancé et est souvent liée au syndrome métabolique (combinaison de pression artérielle, dyslipidémie, obésité et résistance à l'insuline).
- Le **diabète mellitus type 1** est moins fréquent (moins de 10 % des cas) et touche principalement les jeunes. Le pancréas, après un processus auto-immun, ne produit pas ou plus assez d'insuline.
- **Maturity onset diabetes of the young (MODY)** (proportion estimée à 1 à 2 %) : une déficience en insuline due à une anomalie génétique dans les cellules β -pancréatiques, qui se déclare généralement chez les personnes de moins de 25 ans. Un total de 11 types différents de MODY ont déjà été observés sur la base de 11 gènes correspondants modifiés.
- On dénombre également plusieurs types rarissimes (1 cas sur 100 000). Affections mitochondriales (MITO), causées par des anomalies de l'ADN mitochondrial (transmis par la mère) et pouvant entraîner la surdit . Le diab te n onatal (NEO) est une forme h ereditaire de diab te d etect e avant l' ge de 6 mois. Elle peut dispara tre   nouveau pendant la premi re ann e de vie, mais reste permanente dans la moiti  des cas.
- Le nombre r el de patients souffrant du diab te est potentiellement plus  lev . Selon [l'Enqu te de sant  par examen belge](#), r alis e par Sciensano, un tiers des patients atteints de diab te ignorent qu'ils en souffrent, une partie ne suit pas non plus de traitement m dicamenteux. L'augmentation des chiffres de ces derni res ann es peut  tre d    l'am lioration du d pistage du diab te et   une m dicalisation croissante.
- Les femmes souffrant de diab te de grossesse (environ 2 % des femmes enceintes) ne figurent pas dans ces statistiques. Leur  quilibre hormonal perturb  entra ne une diminution temporaire de l'effet de l'insuline. Ces patientes sont filtr es   l'aide des codes nomenclature relatifs aux [accouchements](#).
- Les chiffres sont bas s sur des ann es de population compl tes, c. -d. qu'ils comprennent toutes les personnes n es ou d c d es au cours de l'ann e de r f rence.
- Avant 2008, les ind pendants n' taient pas couverts pour les « petits risques » dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire, en ce compris le remboursement des m dicaments prescrits par le m decin g n raliste. Par cons quent, ces personnes n'apparaissent pas dans les chiffres ant rieurs au 1er janvier 2008. Vous trouverez davantage d'explications sur le site web de [l'INAMI](#).
- La tranche d' ge est d finie sur la base de l' ge des b n ficiaires au 31 d cembre de l'ann e de r f rence.
- Vous trouverez davantage d'informations contextualis es relatives aux statistiques dans le [chiffre-cl  Atlas sur le th me du diab te](#).

Fr quence et timing de la mise   jour : les statistiques de l'ann e civile 2 sont ajout es chaque ann e durant le Q1.

Code

cube_002_001_At

Variable(s) source(s)

- [SS00050-Quantit ](#)
- [ATC_PHAR_L-Code ATC niveau 3](#)
- [DIABETES_PASPOORT-Suivi diab te](#)
- [ZORGTRAJECT1-Trajets de soins Diab te](#)
- [DIABETES_CONVENTIE-Convention diab te](#)

Variable(s)  quivalente(s)

- [stat_002_001-Pr valence diab te](#)
- [stat_002_002-Pr valence consommateurs d'insuline](#)
- [stat_002_003-Pr valence consommateurs non insuline](#)
- [stat_002_006-Suivi minimal de patients diab tiques trait s   l'insuline](#)
- [stat_002_007-Suivi minimal de patients diab tiques non trait s   l'insuline](#)
- [stat_002_008-Patients trait s   l'insuline comptant une convention, passeport diab te ou trajet de soins](#)
- [stat_002_009-Patients non trait s   l'insuline comptant une convention, passeport diab te ou trajet de soins](#)
- [stat_002_012_At](#)

Mots cl s

Le plus petit niveau géographique disponible : Secteur statistique

Méthode de calcul

(Nombre de bénéficiaires comptant une [délivrance d'au moins 37,5 DDD d'insuline \[ATC A10A\]](#), une [délivrance d'au moins 270 DDD de médicaments hypoglycémifiants \[A10B\]](#), et/ou à qui des [codes nomenclature](#) ont été facturés dans le cadre d'un [trajet de démarrage](#), d'un [trajet de soins](#) ou d'une [convention diabète](#) [excepté les femmes comptant une facturation de [codes nomenclature](#) pour accouchement]) / (Nombre de bénéficiaires [excepté les femmes comptant une facturation de [codes nomenclature](#) pour accouchement]) x 100

Disponible

2007

Dimensions

- [Catégorie d'âge](#)
- [Sexe](#)
- [Intervention majorée](#)

Référence recommandée

IMA_AIM (03/12/2025), cube_002_001, [Atlas IMA_AIM \(accessed on 17/06/2026\)](#)

Dernière mise à jour des métadonnées

03/12/2025