

var Consommateurs d'antipsychotiques très courte durée ([Atlas](#))

Description

Pourcentage de bénéficiaires de l'assurance maladie en Belgique âgés de 18 ans et plus ayant, au cours de l'année de référence, entamé un traitement médicamenteux d'antipsychotiques (délivrance en officine publique d'au moins une dose journalière standard [DDD] d'un médicament portant le code ATC-3 N05A) d'une durée inférieure à trois mois. L'indicateur peut être ventilé selon la tranche d'âge, le sexe et le droit à l'intervention majorée des bénéficiaires. Il est également possible de filtrer les bénéficiaires qui ont eu recours aux soins à domicile ou séjourné en maison de repos.

Codification

%

Remarques

- La durée du traitement est définie à l'aide du nombre de DDD remboursées au patient durant la 'durée de traitement'. Un traitement de très courte durée correspond à une délivrance de 91 DDD au maximum et est défini comme suit :
 - La date du début de traitement correspond à la date de prestation de soins à laquelle le médicament antipsychotique a été prescrit pour la première fois.
 - Le nombre de DDD est additionné depuis la date de début afin de calculer la date de fin (provisoire). La date de fin est définitive en l'absence de nouveau remboursement dans un délai de six mois suivant cette date.
 - Si, dans un délai de six mois suivant la date de fin provisoire, un autre conditionnement de ce médicament est remboursé, la durée de traitement se poursuit. Une nouvelle date de fin provisoire est alors définie en additionnant le nombre de DDD à la date de prestation de soins à laquelle les antipsychotiques ont à nouveau été prescrits.
 - Si plusieurs périodes de traitements sont en cours durant la même année civile, seule la période de traitement la plus longue est prise en considération dans ces données.
- La durée de traitement peut couvrir plusieurs années civiles. Dans ce cas, non seulement la durée de traitement au cours de l'année de référence, mais aussi la durée d'un traitement ayant eu lieu au moins durant une partie de l'année de référence sont prises en considération. Il est tenu compte des traitements de l'année précédant l'année de référence et de l'année suivant celle-ci.
- La dose journalière standard ou *Defined Daily Dose* (DDD) est l'unité de mesure internationale créée par [l'Organisation Mondiale de la Santé](#). Elle permet la comparaison de l'usage de différents médicaments. Il s'agit d'une estimation de la dose moyenne journalière que consomme par jour un adulte d'un poids corporel d'environ 70 kg dans son indication principale. L'utilisation des DDD a pourtant quelques limitations. La valeur d'une DDD ne correspond pas toujours avec la posologie optimale. Celle-ci peut varier d'un patient à l'autre et peut être adaptée en cours de traitement. Il s'agit donc ici d'une **approximation** de la durée de consommation.
- L'âge de référence correspond à celui des bénéficiaires au 31 décembre de l'année de référence.
- Il s'agit ici uniquement de spécialités pharmaceutiques, à savoir des médicaments produits par des firmes pharmaceutiques. Ils sont remboursés par l'assurance maladie lorsque les conditions suivantes sont remplies :
 - Le médicament figure sur la liste des spécialités pharmaceutiques dont le remboursement est prévu par l'assurance maladie.
 - Le médicament a fait l'objet d'une prescription par un médecin, un dentiste ou une sage-femme.
 - Le médicament est délivré par un pharmacien.
- La classification ATC est un classement international créé par [l'Organisation mondiale de la santé](#) (OMS) qui répartit les principes actifs des médicaments en groupes selon l'organe ou le système sur lequel ils agissent et selon leurs caractéristiques thérapeutiques, pharmacologiques et chimiques.

Code

cube_017_013_At

Variable(s) source(s)

- [SS00050-Quantité](#)
- [SS00135-Code CNK](#)
- [ATC_PHAR_L-Code ATC niveau 3](#)

Variable(s) équivalente(s)

- [stat_017_013-Consommateurs d'antipsychotiques très courte durée](#)
- [cube_017_002-Volume DDD d'antipsychotiques par 1 000 bénéficiaires par jour](#)
- [cube_017_006-Consommateurs d'antipsychotiques](#)
- [cube_017_014-Consommateurs d'antipsychotiques courte durée](#)
- [cube_017_015-Consommateurs d'antipsychotiques durée moyenne](#)
- [cube_017_016-Consommateurs d'antipsychotiques longue durée](#)
- [stat_017_029_At](#)

Mots clés

- Les chiffres par unité géographique sont basés sur le domicile du bénéficiaire au 31 décembre de l'année de référence. En cas de domicile inconnu à cette date, on utilise le domicile au 30 juin. Les personnes sans domicile connu ne sont comptabilisées que dans les chiffres du niveau 'Belgique'.
- Vous trouverez davantage d'informations dans le Chiffre-clé Atlas sur le thème de la [consommation d'antipsychotiques en Belgique](#).

Fréquence et timing de la mise à jour : les statistiques de l'année civile 2 sont ajoutées chaque année durant le Q4.

Le plus petit niveau géographique disponible : Commune

Méthode de calcul

(Nombre de bénéficiaires [18 ans et plus] comptant une délivrance de [1 à 91 DDD](#) d'antipsychotiques [[ATC-3](#) = N05A] au cours de la période de traitement) / (Nombre de bénéficiaires [18 ans et plus] comptant au moins [1 DDD](#) d'antipsychotiques [[ATC-3](#) = N05A] au cours de l'année civile) / 100)

Disponible

2008

Dimensions

- [Catégorie d'âge](#)
- [Sexe](#)
- [Soins longue durée](#)
- [Intervention majorée](#)

Référence recommandéeIMA_AIM (23/09/2025), cube_017_013, [Atlas IMA_AIM \(accessed on 21/04/2026\)](#)**Dernière mise à jour des métadonnées**

23/09/2025