var Gebruikers met eerste dosis antidementia voorgeschreven door arts-specialist *(Atlas)*

Beschrijving

Aandeel van de rechthebbenden van de Belgische ziekteverzekering, 65 jaar en ouder, die in het referentiejaar behandeld werd met antidementia (aflevering van minstens één standaarddagdosis (DDD) van een geneesmiddel met ATC3-code N06D in een publieke apotheek), waarbij het eerste voorschrift voor de therapieperiode werd voorgeschreven door een arts-specialist.

Codering
%

Opmerkingen

- De therapieperiode wordt als volgt bepaald.
  - De begindatum van de therapie is de datum van de zorgverstrekking waarbij antidementia voor het eerst werd voorgeschreven.
  - Bij de begindatum wordt het aantal DDD's opgeteld om de (voorlopige) einddatum te bepalen. De einddatum is definitief indien er geen nieuwe terugbetaling is voor antidementia binnen de zes maanden na deze datum.
  - Indien er binnen de zes maanden na de voorlopige einddatum wel nog een verpakking van dit geneesmiddel wordt terugbetaald, blijft de therapieperiode doorlopen. Er wordt een nieuwe voorlopige einddatum bepaald door het aantal DDD's op te tellen bij de datum van de zorgverstrekking waarbij opnieuw antidementia werd voorgeschreven.
  - Indien er meerdere therapieperiode's zijn in hetzelfde kalenderjaar, wordt in deze data enkel gekeken naar de langste therapieperiode.
- De therapieduur kan over meerdere kalenderjaren lopen. Er wordt hierbij niet enkel gekeken naar de therapieduur in het referentiejaar, maar naar de duurtijd van een therapie die in het referentiejaar van start ging.
- Een standaarddagdosis of een *Defined Daily Dose* (DDD) is de internationale meeteenheid die uitgaat van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die toelaat om het verbruik van geneesmiddelen te vergelijken. Het is de veronderstelde gemiddelde dagelijkse dosis die gebruikt wordt door een volwassen persoon van 70 kg voor de voornaamste indicatie. Deze eenheid heeft echter wel een aantal beperkingen. Een DDD is niet noodzakelijk de optimale dosering – deze varieert van patiënt tot patiënt, en kan aangepast worden in de loop van de behandeling. Het gaat hier dus om een **benadering** van de gebruiksduur.
- De leeftijd wordt op bepaald op basis van de leeftijd van de rechthebbenden op 31 december van het referentiejaar.
- Het gaat hier enkel om farmaceutische specialiteiten. Dat zijn geneesmiddelen die geproduceerd worden door farmaceutische bedrijven. Deze worden terugbetaald door de ziekteverzekering indien aan deze voorwaarden wordt voldaan.
  - Het geneesmiddel staat op de lijst van farmaceutische specialiteiten waarvoor een terugbetaling door de ziekteverzekering is voorzien.
  - Er werd een voorschrift opgesteld door een arts, tandarts of vroedvrouw.
  - Het geneesmiddel wordt afgeleverd door een apotheker.
- De ATC-classificatie is een internationale indeling van geneesmiddelen, die uitgaat van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hierbij worden de actieve bestanddelen van geneesmiddelen ingedeeld in groepen op basis van het orgaan of systeem waar ze op werken, en hun therapeutische, farmacologische en chemische eigenschappen.
- De cijfers per geografische entiteit zijn gebaseerd op de woonplaats van de rechthebbenden op 31 december van het referentiejaar. Is deze op dat moment niet gekend, wordt deze gebaseerd op de woonplaats op 30 juni. Personen zonder gekend adres worden enkel op het Belgische niveau

Code

stat_017_028_At

Bronvariabelen

- SS00050-Hoeveelheid
- SS00070B-Bekwaming voorschrijver
- SS00135-CNK-code
- ATC_PHAR_L-ATC-code niveau 3

Verwante variabelen

- stat_017_004-Volume DDD antidementia per 1.000 rechthebbenden per dag
- stat_017_008-Gebruikers antidementia
- stat_017_021-Gebruikers antidementia zeer korte duur
- stat_017_022-Gebruikers antidementia korte duur
- stat_017_023-Gebruikers antidementia middellange duur

Trefwoorden

Geneesmiddelen en medisch materiaal,
Ziektebeelden en handicaps

meegeteld.
- Meer informatie over de behandeling van dementie vindt u terug in het advies nr. 8890 van de Hoge Gezondheidsraad en het Atlas Kerncijfer omtrent het gebruik van antidementia in België.

Frequentie en timing van update: jaarlijks in Q4 worden de statistieken van kalenderjaar -1 toegevoegd.

Kleinst beschikbare geografische niveau: gemeente

Berekeningswijze
(Aantal rechthebbenden (65 jaar en ouder) met aflevering van minstens 1 DDD antidementia (ATC-3 = N06D), waarbij eerste voorschrift uitgeschreven werd door arts-specialist (SS00070B >= 010) /
(Aantal rechthebbenden (65 jaar en ouder) met aflevering van minstens 1 DDD antidementia (ATC-3 = N06D) in het kalenderjaar) / 100)

Beschikbaar 2008

Aanbevolen referentie IMA_AIM (23/09/2025), stat_017_028, Atlas IMA_AIM (accessed on 17/11/2026)

Metadata laatst bijgewerkt 23/09/2025